

Schwarzer Apollo – *Parnassius mnemosyne*

Merkmale Falter:

- 28-34 mm Flügellänge
- Weiße Grundfarbe mit transparenten Flügelspitzen
- Je zwei schwarze Punkte auf den Vorderflügeln
- Schwarze Zeichnungen auf den Hinterflügeln
- Weibliche Falter mit gelber Zeichnung an den Seiten des Hinterleibs

Unterscheidung der Falter von anderen Schmetterlingsarten:

- Durch die Größe mit weißlicher Grundfarbe und etwas pergamentartig wirkenden Flügeln nur wenig Verwechslungsmöglichkeiten mit heimischen Schmetterlingsarten
- Am ähnlichsten ist der Baumweißling (*Aporia crataegi*), dem aber die typischen schwarzen Flecken auf den Flügeln fehlen. Vor allem im Flug bestehen jedoch Verwechslungsmöglichkeiten
- Der Große Kohlweißling (*Pieris brassicae*) kann auch eine ähnliche Größe erreichen, unterscheidet sich jedoch vom gesamten Erscheinungsbild: Keine transparenten, sondern schwarze Flügelspitzen, Hinterflügelunterseiten mit mehr oder weniger gelblicher Färbung, andere Fleckenverteilung
- Die anderen heimischen Apollofalter haben rote Zeichnungselemente

Merkmale Raupen:

- Die Raupen sind schwarz bis dunkelbraun mit seitlichen orangefarbenen Fleckenreihen
- Sie leben an Lerchensporn (*Corydalis* sp.) in Waldrandlagen, Lichtungen, lichten Waldbeständen oder an Gehölzgruppen
- Relativ gut zu finden sind die typischen Raupenfraßspuren an den Lerchenspornblättern, die erste Hinweise bei der Raupensuche liefern



Foto: Thomas Stumpf

Raube des Schwarzen Apollos