

## **Birkenmaus - *Sicista betulina***


### **Verbreitung der Birkenmaus inklusive Hinweise auf Schwerpunktorkommen**

In Deutschland sind Vorkommen der Birkenmaus nur aus drei weit voneinander entfernt liegenden Gebieten bekannt: aus dem nördlichen Schleswig-Holstein, dem Bayerischen Wald und dem bayerischen Allgäu. Insgesamt liegen aus Deutschland nur ca. 20 Nachweise und Beobachtungen vor (Meinig 2004). Daneben sind Vorkommen in Dänemark, Schweden, Finnland, den baltischen Republiken, Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei bekannt (Mitchell-Jones et al. 1999).

Dass die Birkenmaus in Deutschland vorkommt, wurde erst im Jahr 1936 festgestellt, als die Art in Schleswig-Holstein gefunden wurde (Mohr 1951). Im Bayerischen Wald gelang der erste Fund 1950 auf einer von Wald umgebenen Wiese (Kahmann & Wachtendorf 1951), im Allgäu wurde die Birkenmaus 1985 zum ersten Mal beobachtet.

## Birkenmaus (*Sicista betulina*)

### Verbreitung der Art in Deutschland



Nachweise ab 1990, Stand: 2006

Fachliche Grundlagen: LANIS-Bund, Bundesamt für Naturschutz (BfN), Naturräumliche Gliederung nach Meynen/Schmidthüsen (1990)  
Topographische Grundlage: VG 1000 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie ([www.bkg.bund.de](http://www.bkg.bund.de))