

## Donau-Kaulbarsch – *Gymnocephalus baloni*

### Merkmale:

- Kurzer, kräftiger Körper und kurzer, stumpfer, vom Körper abgesetzter Kopf
- Zwei Dornen an den Kiemendeckeln, Vordeckel gezähnt (Holčík & Hensel 1974)
- Die beiden Rückenflossen stoßen aneinander; die Oberkante der zweiten Rückenflosse steht senkrecht zur Längsachse des Fisches
- Rückenflosse mit 14-16 Hartstrahlen
- Afterflosse mit stark gebogenen Stachelstrahlen; der erste Stachelstrahl ist kürzer als der zweite
- Auge überragt mit Oberkante das Kopfprofil
- Graue Körperseiten mit unregelmäßige Flecken und 4-6 Querbändern (Holčík & Hensel 1974), die während der Brutzeit bei den Männchen nur noch schwach oder gar nicht mehr zu sehen sind (Specziár & Vida, 1995)
- Länge bis etwa 15 cm (vgl. Holčík & Hensel 1974, Kováč 1993, Specziár & Vida 1995)
- Körperhöhe 27-30 % der Standardlänge

### Unterscheidung von Kaulbarsch und Schrätzer:

- Kaulbarsch - *Gymnocephalus cernuus*: gelbliche Färbung der Körperseiten mit vielen kleinen unregelmäßigen schwarzen Flecken, 11-16 Rückendornen, Größe bis 20 cm; Körperhöhe 24-27 % der Standardlänge
- Schrätzer - *Gymnocephalus schraetser*: drei unterbrochene Streifen entlang der Seiten, 17-19 Rückendornen, Größe bis 25 cm