

## Moor-Wiesenvögelchen – *Coenonympha oedippus*

### Merkmale:

- 18-21 mm Flügelspannweite
- Grundfarbe der Flügeloberseite dunkelbraun, der Flügelunterseite gelbbraun
- Auf den Flügelunterseiten Reihen von Augenflecken, umgeben von einem gelblichen Ring. Im Hinterflügel steht ein Augenfleck auf der Innenseite der angrenzenden mehr oder weniger deutlichen weißen Binde
- Silbrige, außen orangefarbene Randbinde

### Unterscheidung der Falter von anderen Schmetterlingsarten:

- Je nach Vorwissen kann das Moor-Wiesenvögelchen mit zahlreichen anderen Augenfaltern verwechselt werden. Neben verschiedenen Arten der Gattung *Coenonympha* (Wiesenvögelchen) ist hier insbesondere der häufige Kaminkehrer (*Aphantopus hyperantus*) zu nennen
- Für eine sichere Unterscheidung sind vertiefte Kenntnisse notwendig
- Die oben angeführten Merkmale müssen in Kombination erfüllt sein

### Merkmale Raupen:

- Die Grundfarbe ist meist grün, während der Überwinterung braun, mit hellen und grünlichen (bzw. bräunlichen) Längsstreifen
- Zwei deutliche Hinterleibsanhänge, wie bei allen verwandten Arten
- Sehr gut getarnt und kaum zu finden



Foto: Geyer & Dolek

Junge Raupe Anfang April, direkt nach der Überwinterung noch in gelblich-bräunlicher Färbung. Die Färbung der Streu im Bildhintergrund deutet die gute Tarnung an. Am Grashalm sind rechts Fraßspuren der Raupe zu sehen.